

ESBORRANY 1

ANNEX 7 . Protocol de vigilància i d'actuació davant la detecció de qualsevol símptoma compatible amb COVID-19 entre els professionals adults dels centres educatius (treballadors docents i **no docents)**

L'epidèmia per COVID-19 fa necessari establir un protocol de vigilància i actuació del professorat i resta de professionals amb símptomes compatibles.

S'han de seguir les bones pràctiques als centres de treball recomanades pel Ministeri de Sanitat:

<https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf>

Segons les directrius del Ministeri de Sanitat, l'àrea sanitària del servei de prevenció ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació a la infecció del SARS - CoV-2, establir la naturalesa de l'especial sensibilitat i emetre informe damunt les mesures de prevenció, adaptació i protecció.

El Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys

Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per poder fer el testeig i rastreig dels contactes estrets amb l'objectiu d'identificar els focus i prendre les mesures adequades.

Els Serveis de prevenció, d'acord amb el procediment, elaborat pel Ministeri de sanitat, per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2", amb caràcter previ a la reincorporació presencial hauran de classificar els llocs de treball conforme als 3 grups de risc determinats en el "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició".

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf

Els llocs de treball dels centres educatius estan classificats segons aquest procediment com a **exposició de baix risc (nivell 2)**, per la qual cosa s'hauran d'adoptar les mesures preventives de mantenir 2 metres de distància o disposar de barreres físiques per evitar el contacte i, en certes situacions l'ús de protecció respiratòria i guants de protecció

Coordinació d'activitats empresarials:

D'acord amb el que disposa el punt 2 de l'art. 24 de la LPRL; el titular del centre haurà de realitzar les actuacions necessàries per a garantir a tot el personal que desenvolupi les tasques en el centre educatiu, d'acord a les mesures preventives establertes en aquest informe, així com garantir que disposin de l'equipament de protecció individual (mascaretes, guants...) inclosos en aquest informe.

Una vegada que les mesures preventives s'hagin dut a terme, es comunicaran al Servei de Prevenció de Riscos Laborals .

En el supòsit que un professional d'un centre educatiu presenti símptomes compatibles de la COVID-19 fora del centre educatiu, no ha d'anar al centre, s'ha de posar en contacte amb el seu centre de salut i amb el servei de prevenció de riscos laborals per rebre les instruccions adients.

El Ministeri de Sanitat ha publicat que a Espanya, els símptomes més freqüents són: febre recent o febre perllongada (68,7%), tos (68,1%), mal de gargamella (24,1%), dificultat respiratòria/dispnea (31%), calfreds (27%), vòmits (6%), diarrea (14%) i altres símptomes respiratoris (4,5%), a més s'han descrit altres símptomes relacionats amb distints òrgans i sistemes.

En el cas, que el treballador presenti símptomes compatibles amb infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu:

- S'ha de colocar una màscara quirúrgica
- Rentar-se les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
- Comunicar a l'equip directiu la situació, millor si pot ser per telèfon.
- **Telefonar als 2 número de telèfon del servei de salut 902 079 079 ò 971 437 079 o al 061 si és urgent i seguir les instruccions.** Si el servei de salut recomana el trasllat al domicili seguirà les instruccions indicades i en ser-hi, el treballador posarà en coneixement al servei de prevenció el seu estat. En cas que no sigui així i el consell del servei de salut sigui que es quedi al centre fins rebre assistència, s'ha d'aïllar a una sala/despatx, habilitada específicament i identificada com a tal. Aquesta sala/despatx ha de ser una sala que es pugui ventilar periòdicament i acondicionada per poder respectar les distàncies i que el treballador que ha de estar allà pugui estar còmode. Procurar que en aquesta sala/despatx s'hagin enretirat tots els objectes que puguin dificultar després una bona neteja.
Mantenir-se en tot moment en comunicació amb l'equip directiu, preferiblement per telèfon, fins que arribi l'assistència sanitària. En qualsevol cas, si l'estat clínic ho requerís, i hi hagués d'haver presència d'algun treballador del equip directiu dins la sala d'aïllament, sempre que sigui possible estarà separat 2 metres o més i utilitzarà mascareta quirúrgica, pantalla facial i guants.
- El treballador amb símptomes, ha d'evitar, en el possible, passar per zones del centre on hi hagi concurrència de professors, personal no docent o alumnes.
- En el domicili, seguirà les pautes recomanades:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
- **Un cop que el treballador hagi marxat del centre educatiu, es procedirà a precintat la sala/despatx i s'esperarà dues hores per a realitzar la neteja seguint el protocol descrit en l'Annex 5. Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius per casos de COVID-19**

Estudi de contactes.

L'àrea sanitària del servei de prevenció de riscos laborals seran els encarregats de establir els mecanismes per a la investigació i seguiment dels contactes estrets dins l'àmbit de les seves competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut pública